

Nome: _____ N.º: ____ Turma: ____

1.ª Parte

Para cada uma das seguintes 5 questões de escolha múltipla, seleccione a resposta correcta de entre as alternativas que lhe são apresentadas e escreva na sua folha de respostas a letra que lhe corresponde.

Atenção! Se apresentar mais do que uma resposta a que estão será anulada, o mesmo a contendo e m caso de resposta a mbígua. **Cotação:** cada resposta certa, +10 pon tos; cada resposta errada, -10/3 pon tos; questão não respondida ou anulada, 0 pontos.

1. Sejam A e B os pontos de abcissa $\sqrt{2}$ que pertencem à elipse de equação $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{8} = 1$.


A área do triângulo [AOB] (O é a origem do referencial) é (em unidades de área):

- [A] $\sqrt{2}$. [B] $2\sqrt{2}$. [C] 4 . [D] $4\sqrt{2}$.

2. A recta r é tangente ao gráfico de $g: x \rightarrow e^x$ no ponto A de abcissa $\ln 2$.

Uma equação de r é:

- [A] $y = 2x + 2 - \ln 4$. [B] $y = 2x + 2\ln\sqrt{2}$.
 [C] $y = -\frac{1}{2}x + \ln(e^2\sqrt{2})$. [D] $y = 2x + \frac{1}{2}\ln 2 + e^2$.



3. Seja $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função tal que:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$
- $g(0) = 2$
- a função $|g|$ (módulo de g) é diferenciável em \mathbb{R}

Qual dos seguintes gráficos poderá ser o da função g ?

- [A]

[B]

[C]

[D]

4. No início de 1999 uma certa cidade tinha 1,5 milhões de habitantes, e está a crescer à taxa anual de 2%.

O ano em cujo início se prevê que a população ultrapasse já os 2 milhões é:

[A] 2002

[B] 2014

[C] 2006

[D] 2013

5. Considere a função m definida por $m(x) = \begin{cases} e^{2x} + k & \Leftarrow x \leq 0 \\ \frac{\text{sen } x}{x} & \Leftarrow x > 0 \end{cases}$.

O valor de k para o qual é possível aplicar o teorema de Bolzano à função m no intervalo $[-\frac{1}{e}, e]$ é:

[A] $-e$.

[B] $\frac{1}{e}$.

[C] 1.

[D] 0.

2.ª Parte

Nas questões seguintes, apresente o seu raciocínio de forma clara, indicando todos os cálculos que tiver de efectuar e as justificações que entender necessárias.

1. A biomassa, em mg , de uma cultura bacteriana é dada em função do tempo, em *horas*, por

$$C(t) = \frac{20}{1 + 3e^{-0,5t}} \quad (t \geq 0)$$

a) De que quantidade de massa se partiu?

Quanto tempo (aproximação ao minuto) decorreu até que a massa foi de 15 mg?

b) Considere a função definida em IR_0^+ por $C(t)$.

b1) Estude a monotonia da função, as concavidades e pontos de inflexão do seu gráfico.

Sugestão: Comece por mostrar que $C'(t) = \frac{30e^{-0,5t}}{(1 + 3e^{-0,5t})^2}$ e $C''(t) = \frac{15e^{-0,5t} \cdot (3e^{-0,5t} - 1)}{(1 + 3e^{-0,5t})^3}$ (C' e C'' designam, respectivamente, as funções 1.ª e 2.ª derivadas de C)

b2) Estude a existência de assíntotas do gráfico da função.

c) Tendo em consideração o estudo efectuado nas alíneas anteriores:

- Interprete os resultados relativamente à situação inicialmente apresentada.
- Em que instante começou a travar o crescimento desta biomassa? Justifique.

2. Considere a função real de variável real definida por $f(x) = \frac{1}{\ln(x-1)}$.

a) Determine o domínio de f e os valores de x tais que $\frac{1}{f(x)} < 2$.


b) Mostre que o gráfico de f admite apenas duas assíntotas.

c) Caracterize f^{-1} , função inversa de f .

3. Os alunos de uma turma do 12.º ano pretendem realizar um passeio de finalistas, mas não conseguem chegar a acordo acerca do destino. Na pré-inscrição, 20 inscreveram-se no passeio a Londres, 12 inscreveram-se no passeio a Paris, 10 inscreveram-se nos dois destinos. Todos os alunos se inscreveram pelo menos num destino.
- Mostre que a turma é constituída por 22 alunos.
 - Decidiu-se formar uma comissão com 2 alunos da turma para decidir o destino da viagem. De quantas maneiras se pode formar a comissão?
 - Qual a probabilidade de, escolhida aleatoriamente esta comissão, os alunos que a formam tenham manifestado pelo menos um destino comum?

4. No referencial ortonormado (O, x, y, z) da figura,


- $[ABCO]$ é um quadrado que tem de lado 3 unidades;
- EF é um arco da circunferência de centro O ;
- a área do sector circular limitado pelo arco EF e pelos segmentos $[OE]$ e $[OF]$ é π unidades de área.



- Determine as coordenadas dos pontos A , B e F .
- Determine uma equação cartesiana do plano α , sabendo que $A \in \alpha$ e $\vec{EF} \perp \alpha$
- Identifique e defina analiticamente a superfície descrita pelo quarto da circunferência quando dá uma volta completa em torno do eixo Ox .

5. Ignorando o atrito, o tempo t (em segundos) necessário para um bloco deslizar por um plano inclinado é dado pela fórmula

$$t = \sqrt{\frac{2.B}{g \cdot \sin(\alpha) \cdot \cos(\alpha)}}$$



onde B é a medida do comprimento da base em metros e g é a aceleração da gravidade.

Supondo que a medida do comprimento da base é 19,6 m e que a aceleração da gravidade é 9,8 m/s², determine o(s) valor(es) de α para que o bloco demore 4 segundos a deslizar pelo plano inclinado.

Interprete as soluções encontradas relativamente à situação apresentada.

Formulário

$$\sin(2x) = 2 \cdot \sin x \cdot \cos x$$

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\operatorname{tg}(2x) = \frac{2 \cdot \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg}^2 x}$$

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cdot \cos b \pm \cos a \cdot \sin b$$

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cdot \cos b \mp \sin a \cdot \sin b$$

$$\operatorname{tg}(a \pm b) = \frac{\operatorname{tga} \pm \operatorname{tgb}}{1 \mp \operatorname{tga} \cdot \operatorname{tgb}}$$

FIM

O Professor

COTAÇÕES

1.ª Parte 50 pontos

Cada resposta certa +10 pontos

Cada resposta errada -10/3 pontos

Cada questão não respondida ou anulada 0 pontos

Um total inferior a zero na 1.ª Parte vale 0 pontos.

	E	R	R	A	D	A	S
	0	1	2	3	4	5	
C	0	0	0	0	0	0	0
E	1	10	7	3	0	0	
R	2	20	17	13	10		
T	3	30	27	23			
A	4	40	37				
S	5	50					

2.ª Parte 150 pontos

1. 53 pontos

a) 12

b1) 23

b2) 10

c) 8

2. 37 pontos

a) 12

b) 15

c) 10

3. 20 pontos

a) 6

b) 7

c) 7

4. 20 pontos

a) 6

b) 7

c) 7

5. 20 pontos

Total 200 pontos